Preview from Notesale.co.uk
Page 1 of 104

BIOENERGETIQUE

3 - Liaison énoil phosphate : Phosphoénoil pyruvate (PEP)

$\Delta G^{0'} = - 62 \text{ kJ/mol}$

4 - Liaison thioester : Acétyl CoA

Acyl CoA

$\Delta G^{0'} = - 31 \text{ kJ/mol}$

**Coenzyme Q (Q)
(ou Ubiquinone, UQ)**

Forme oxydée

Chaîne très apolaire
(polyisoprénique = R)

Ubiquinone
(UQ, Q)

Preview from Notesale.co.uk
Page 25 of 104

Semiquinone
(UQH·, QH·)

Ubiquinol
(UQH₂, QH₂)

Forme réduite

- **Caractéristiques :** – coenzyme mobile peut échanger des électrons avec des coenzymes monovalents

Phosphorylation du Fructose 6P : Phosphofructokinase 1 (PFK1)

**Fructose 6 Phosphate
(F 6P)**

**Fructose 1,6 bisPhosphate
(F 1,6 biP)**

- Réaction fortement exergonique = irréversible
- 1 ATP consommé
- PFK1 est une Enzyme clé :
 - sa vitesse est la plus lente de la glycolyse
 - étape limitante de la voie métabolique
 - sa régulation est étroite (ATP, AMP ...)
 - dépend du niveau énergétique de la cellule

Bilan de la phase préparatoire

Une molécule de Glc entraîne :

• La consommation de 2 ATP

• La formation de 2 Glycéraldéhydes-3P + 2 ADP

La phase préparatoire a un coût énergétique de 2 ATP

Etape 8

Isomérisation du 3P glycérate en 2P glycérate

Déplacement d'un phosphate Phosphoglycérate mutase

Preview from Notesale.co.uk
Page 41 of 104

3 Phospho Glycérate

2 Phospho Glycérate

- Réaction faiblement endergonique, réversible

Schéma de la glycolyse (1)

1 - Phase de préparation : activation

2 Phosphorylations = consommation de 2 ATP

Bilan de la glycolyse cytoplasmique (1)

- Le terme ultime de la glycolyse est le Pyruvate

- Jusqu'au stade pyruvate, toute la voie se déroule en anaérobiose dans le cytoplasme

- La réaction générale s'écrit :

2ème Etape

La sous-unité E2-lipoïque régénère E1-TPP

- C'est une réaction d'oxydo-réduction avec création d'une liaison thioester riche en énergie = Acétyl lipoate

Preview from Notesale.co.uk
Page 56 of 104

Aldéhyde actif

Acétyl-lipoate

Vue d'ensemble sur le cycle de Krebs

1 - Il a pour but :

- d'oxyder l'acétylCoA en $2 \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$
- d'extraire l'énergie de l'acétylCoA et
- de réduire NAD^+ en NADH , H^+
 FAD en FADH_2

qui entrent dans la CRM

2 - Il nécessite un ensemble coordonné de 8 réactions qui catabolisent l'AcétylCoA ($\leftarrow$ glucides, AG, certains AA) et qui se font :

- en aérobiose, dans la matrice mitochondriale
- grâce à 7 enzymes solubles
- et 1 enzyme fixé dans la membrane interne : la succinate déshydrogénase

3 - Il est couplé à la CRM :

les coenzymes réduits formés dans le cycle (3 NADH , H^+ et 1 FADH_2)
permettent la synthèse d'ATP dans la CRM

Les réactions du cycle de Krebs

Le cycle de Krebs comporte 8 étapes :

- 1 condensation de l'AcétylCoA avec l'oxaloacétate à 4 C $\longrightarrow$ Acide Citrique (= Acide tricarboxylique)
- 2 décarboxylations
- 4 oxydations
- 1 phosphorylation du GDP

Preview from Notesale.co.uk
Page 73 of 104

Régulation du cycle de Krebs

1 - La vitesse d'oxydation de l'acétyl-CoA dans le cycle de Krebs dépend :

- de la concentration en acétyl-CoA qui provient de la glycolyse et de la β oxydation des acides gras
- de l'accumulation des produits énergétiques :
NADH (fonctionnement de la chaîne respiratoire)
et ATP (niveau énergétique de la cellule)
- de l'accumulation de produits intermédiaires du cycle

2 - Le cycle ne peut fonctionner que si, en aval, la CRM dispose d'un apport suffisant en O_2

Schéma du Complexe II : Succinate-Coenzyme Q réductase

Espace intermembranaire

Membrane interne

Matrice

Espace intermembranaire

Membrane interne

Matrice

Schéma du Complexe III : Cytochrome c réductase

Preview from Notesale.co.uk
Page 92 of 104

Espace intermembranaire

Membrane interne

Matrice

Espace intermembranaire

Membrane interne

Matrice

Pompe à protons car saut d'énergie suffisant

Découplage du transport d'e⁻ et de la phosphorylation

Chaîne respiratoire : transport d'e⁻

Phosphorylation de l'ADP en ATP

1 - Il y a découplage entre les 2 fonctions

2 - Agents découplants :

- Dinitrophénol
- Arséniate
- Hormones thyroïdiennes

3 - Les agents découplants agissent en :

- ramenant les H⁺ de l'espace intermembranaire à la matrice sans passer par le Cpl. V : donc pas de synthèse d'ATP
- mais le transport des e⁻ le long de la chaîne n'est pas touché : la chaîne respiratoire continue de fonctionner
- ➔ les découplants affectent le couplage, empêchent donc la récupération d'énergie et entraînent une accélération de la chaîne et de la respiration cellulaire