

**3. Epidémiologie des 5 cancers les plus fréquents :**

	Incidence	Prévalence	Mortalité
<b>Prostate</b>	<b>71500</b>	154000	8790
<b>Sein</b>	52500	<b>185000</b>	11700
<b>Colorectal</b>	40000	110000	17400
<b>Poumon</b>	37000	40000	<b>28700</b>
<b>VADS</b>	10990	34000	3370

**4. Prévention :**

<b>Primaire</b>	<b>Définitions</b>	- <b>Supprimer l'exposition aux facteurs</b> de risque de cancer avant l'apparition de la maladie
	<b>Moyens</b>	- Cf. ci-dessus
<b>Secondaire</b>	<b>Définition</b>	- <b>Dépister précocement</b> toute lésion précancéreuse ou cancer local afin que le traitement puisse être curatif
	<b>Dépistage de masse organisé</b>	- Cancer colorectal : Patients de 50 à 75 ans sans facteur de risque Test Hémo occult <sub>2</sub> <sup>®</sup> tous les deux ans Recherche de sang occulte dans les selles Coloscopie diagnostique indiquée si test positif - Cancer du sein : Patientes de 50 à 75 ans sans facteur de risque Mammographie bilatérale tous les 2 ans Lecture en aveugle par 2 radiologues spécialisés Résultat rendu selon la classification ACR
	<b>Dépistage individuel</b>	- Cancer de la prostate : Homme > 50 ans avec espérance > 10 ans Homme > 45 ans si facteurs de risque Toucher rectal + PSA annuels Biopsies prostatiques si anomalies - Cancer du col : Femmes de 25 à 65 ans Frottis cervico-vaginal tous les 3 ans Après 2 frottis normaux à 1 an d'intervalle
<b>Tertiaire</b>	<b>Définition</b>	- <b>Eviter la récurrence</b> de la maladie initiale ou des incapacités chroniques qui en découlent
	<b>Moyen</b>	- Surveillance à vie : Clinique : Récurrence locale Aires ganglionnaires Métastases Paraclinique : imagerie et marqueurs tumoraux

**5. Principes du dépistage :**

<b>Maladie</b>	- Fréquent - Grave - Curable - Bien définie et prioritaire sur le plan de la santé publique - <b>Histoire naturelle</b> connue - Dépistage précoce possible - Traitement <b>améliore la morbi-mortalité</b>
<b>Test</b>	- <b>Validité</b> interne et externe - <b>Reproductible</b> - <b>Acceptable</b> par la population, réalisable en toute innocuité - Faible <b>Coût</b> - Simple, rapide
<b>Population cible</b>	- <b>Sensibilisée</b> à la maladie - Ayant <b>accès</b> au dépistage - <b>Acceptant</b> le dépistage - Données démographiques connues
<b>Réseau</b>	- Existence d'un <b>réseau de soin</b> assurant la prise en charge des sujets dépistés

Preview from Notesale.co.uk  
Page 2 of 2